



CENTRUM ONKOLOGII  
ZIEMI LUBELSKIEJ  
im. św. JANA z DUKLI

# CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND



Lublin, 22.03.2021 r.

## SZCZEPNIENIE PRZECIWIW COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH LECZONYCH SYSTEMOWO

**Onkologia kliniczna** jest jedną z trzech głównych dziedzin medycyny - oprócz chirurgii i radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych. **W onkologii klinicznej stosuje się chemioterapię, chemioimmunoterapię, immunoterapię, leczenie ukierunkowane molekularnie i hormonoterapię.** Pandemia koronawirusa nie przerwała ciągłości opieki nad Pacjentami onkologicznymi poza tymi, którzy nie zgłaszali się do diagnostyki i leczenia z obawy przed zakażeniem koronawirusem.

W naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli mamy pełny dostęp do testów wykrywających zakażenie SARS CoV-2, co umożliwia właściwe postępowanie we wdrażaniu leczenia systemowego – w dziedzinie onkologii klinicznej. Pacjenci zakażeni SARS CoV-2 mają przerwę w leczeniu onkologicznym do momentu ustąpienia infekcji (z wyjątkiem nagłych przypadków indywidualnie kwalifikowanych do leczenia ratunkowego).

Szczepienie przeciwko SARS CoV-2 chroni przed zakażeniem, ciężkim przebiegiem oraz późniejszymi powikłaniami związanymi z COVID-19 i zapewnia ciągłość w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych naszym Pacjentom.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zachęca Pacjentów do szczepień przeciwko SARS CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej Pana Profesora dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego.

Chorzy leczeni immunoterapią, hormonoterapią lub leczeniem ukierunkowanym molekularnie mogą być szczepieni bez ograniczeń, o ile nie mają aktualnie objawów infekcji.

Pacjenci, u których stosujemy chemioterapię o różnym poziomie immunosupresji kwalifikowani są indywidualnie do szczepień przeciwko SARS CoV-2. O szczepieniu decyduje doświadczony onkolog kliniczny oraz - o ile jest taka możliwość – immunolog kliniczny. W leczeniu radykalnym (chemioterapia adjuwantowa lub neoadjuwantowa) rozważamy szczepienie przeciwko SARS CoV-2 po zakończeniu leczenia systemowego. W leczeniu paliatywnym: przykładowo pierwsza dawka szczepionki podawana jest przed/lub po nadirze, a wznowienie chemioterapii następuje około 2 tygodnie po drugiej dawce szczepionki.

**Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie onkologii klinicznej**

*Elżbieta Starostawska*  
**Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starostawska**

**DYREKTOR**  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli

*Elżbieta Starostawska*  
**Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starostawska**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9109634579